



爸媽**疫**起來，寶貝小幼**苗**

■ 寶寶為什麼要打疫苗？

- 建立寶寶免疫能力的重要工作
- 預防寶寶及兒童罹患重大傳染病及感染之後遺症

■ 在哪裡可以接種？需要帶什麼？

- 衛生所及合作的醫院、診所，如：馬偕醫院
- 攜帶**兒童健康手冊**及**健保卡**，初次赴該單位接種者，請同時攜帶戶口名簿，以利資料之登錄

■ 常規疫苗接種時程

出生24小時內	B型肝炎疫苗 第1劑
出生滿24小時以後	卡介苗
出生滿1個月	B型肝炎疫苗 第2劑
出生滿2個月	五合一疫苗 第1劑 結合型肺炎鏈球菌疫苗(13價) 第1劑
出生滿4個月	五合一疫苗 第2劑 結合型肺炎鏈球菌疫苗(13價) 第2劑
出生滿6個月	五合一疫苗 第3劑 結合型肺炎鏈球菌疫苗(13價) 第3劑 自費 B型肝炎疫苗 第3劑 流感疫苗(初次接種二劑，之後每年一劑)
出生滿12個月	水痘疫苗 麻疹 腮腺炎 德國麻疹(MMR)混合疫苗 第1劑
出生滿12~15個月	結合型肺炎鏈球菌疫苗(13價) 第4劑
出生滿15個月	日本腦炎疫苗 第1劑、第2劑(間隔2週)
出生滿18個月	五合一疫苗 第4劑
出生滿27個月	日本腦炎疫苗 第3劑
滿5歲至國小前	麻疹 腮腺炎 德國麻疹(MMR)混合疫苗 第2劑 日本腦炎疫苗 第4劑 四合一疫苗

五合一疫苗:係指白喉、破傷風、百日咳、小兒麻痺、B型嗜血桿菌疫苗

四合一疫苗:係指減量白喉、破傷風、百日咳、小兒麻痺疫苗

■ 接種後注意事項

- 接種部位可能有紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀。
上述反應，通常都是短暫的，會在數日內恢復，請勿揉、抓注射部位。
- 如接種部位紅腫十分嚴重或經過數日不退、出現化膿或持續發燒，請儘速就醫。

■ 疫苗接種部位及途徑

- 依疫苗選擇途徑：皮下注射或肌肉注射
- 兩歲以下嬰幼兒：大腿前外側
- 幼兒：大腿前外側或上臂三角肌接種

■ 疫苗漏打或延遲，怎麼辦？

- 為達到最佳的免疫效果，請家長按時為寶寶補完各劑應接種疫苗
- 並應儘速依衛生單位規定進行補種

■ 什麼情況下不能接種疫苗？

- 發高燒及染患急性疾病
- 先前接種該項疫苗曾發生嚴重過敏反應
- 接種前，都應請醫師評估



您有任何疑問請向醫師或藥師詢問，我們將竭誠為您服務
馬偕紀念醫院藥劑部 (02)2543-3535轉2291



馬偕紀念醫院
MacKay Memorial Hospital